

Arno Sipponen, MD, PhD, Päijät-Häme Central Hospital, Lahti,
Finsko

Září-16

Pozadí a cíl

Muž ve věku 80 let s rakovinou prostaty a diabetes mellitus 2. typu. Pacient měl dva- denní anamnéza bolesti a otoku jeho distálního pravého 2. prstu. V anamnéze nebylo žádné trauma ruky. Pacient neměl horečku ani ztrátu funkce prstu. Při klinickém vyšetření byla pozorována infekce laterálního nehtového záhybu s abscesem (obr. 1).



Obr 1. Před ošetřením.

Postup

Absces byl drénován v lokální anestezii a byla zahájena lokální léčba Abilar 5% Resin Ointment. Mast se nanášela jednou denně. Systémová antimikrobiální terapie nebyla podána.

Výsledky

Po 6 dnech léčby Abilar 5% pryskyřičnou mastí byla paronychie zcela zhojena (obrázek 2.). Nebyly potřeba žádné další možnosti léčby.



Obr. 2. Po 6 dnech léčby

Závěry

Vzhledem k antimikrobiálnímu protizánětlivému působení Abilar 5% Resin Ointment nebyly pozorovány žádné klinické ani laboratorní známky infekce nebo zánětu. Zlepšení epitelizace je během ošetření jasně viditelné.